Muscat Romain du Maroc

Vass2R11s171-175

**EXAMPLE 1** Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1450

Muscal Transing by

Muscal romain s9 2 RM s 171-175





ANGEE: 1996

NOM Muscat romain 19 EMPLACEMENT 2 RM & 171.175

ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit <b>é</b>			
1	4	14.3	183 1	2	3				22.7	26.7	29.7	.19 .8	
2	2	11.3	183.	0						+4		+1	
x				<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L									
8					Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim:								
	De	18.3	96 (+2)	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb									olorē		
	Pépins : avec - ap												
		,			Fort:			<u>v</u> .	igueur				

Muscat romain 59 2 RMA-171, 1754, 1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 — fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

Museat romain 59 2 RMD. 171.1750.1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Nocude : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

# Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1958

Code clone

Observateur: Laconbe

Code cépage :

Nom cépage: Muscar romain & 3

Emplacement: 2 RMANH\_NTS

# Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7)

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1) - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1)- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1) - présente 9

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087\* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

### Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.

# Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année: 1998

Code clone

Observateur : Laconbe

Code cépage :

Nom cépage: Muxat romain 19

Emplacement: 2 RMs 171\_175

## Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue

1 (20-30cm) (7)- très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) (5) - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9

oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement(1)- moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2)

oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

### Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

25 (20-26mm)(7) - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5)- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3)

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenné 5- épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent 1) apparent 2

oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée 1) colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1) - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse (1)- juteuse (2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat (2) goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236\* saveur : aucune 1 - goût musca 2- goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyer 5 difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 35

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 / présentes 2.

# Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Annec 1938
Code cépage Code clone

Observateur TL

Nom cépage Muscat romain 53

Emplacement: 2 RM s171-175

# Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1)- brunâtre 2)- rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence D- présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence D- présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve / très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis 1 - movens@- saillants 3

vigueur: 2.3